


AIRES OMBROTHERMIQUES DES SÉRIES ET SOUS-SÉRIES DE VÉGÉTATION



ETAGE COLLINEEN

ETAGE COLLINEEN DE TYPE SUBMEDITERRANEEN

- 1-Série subméditerranéenne du Chêne pubescent
- 2-Série intra-alpine du Chêne pubescent
- 3-Série septentrionale du Chêne pubescent

ETAGE COLLINEEN DE TYPE MESOPHILE

- 4-Série de la Chênaie à Charme
- 5-Série de la Chênaie acidiphile
- ▲ 6,7-Série planitiaire du Chêne pédonculé et série de l'Aune blanc

ETAGE MONTAGNARD

ETAGE MONTAGNARD DES ALPES EXTERNES

- 8-Série de la Hêtraie-Sapinière
- 9-Série mésophile du Hêtre

ETAGE MONTAGNARD DES ALPES INTERNES

- ▲ 11,12-Série intra-alpine du Sapin et série intra-alpine de l'Epicéa
- 13-Série intra-alpine du Pin sylvestre

ETAGE SUBALPIN

- 14-Série subalpine de l'Epicéa
- 16-Série du Mélèze et du Pin cembro
- ▲ 16^a-Sous-série à Mélèze
- 16^c-Sous-série à Pin cembro

← Facteurs correctifs importants

Les limites des aires ombrothermiques sont représentées par des tiretés de couleur.