


CARTA DELLA VEGETAZIONE DELL'ANFITEATRO MORENICO DI RIVOLI (TORINO) 1:50 000

di Dr. Uberto TOSCO

Laboratorio Crittogamico dell'Ufficio Sanitario del comune di Torino



PIANO PLANIZIALE E COLLINARE MEDIOEUROPEO

SERIE PLANIZIALE DELLA FARNIA E DELL'ONTANO NERO

- Variante tipica a *Quercus pedunculata*.
- Varianti di degradazione, ad *Alnus glutinosa*, *Robinia pseudoacacia*, *Salix sp.pl.*, *Populus* ecc.
- Molinieti, fragmiteti, schoeneteti, cariceti, mareschi, ecc.
- Prati spesso in rotazione con colture, e praterie mesofile (in parte).
- Coltivi vari (pioppeti, vigneti, frutteti ecc.).
- Varianti di massima degradazione e ruderali.

SERIE MESOFILA DEI BOSCHI DI FARNIA, TIGLI E ACERI

- Variante normale a farnia, tigli e aceri.
- Variante a *Quercus sessiliflora* (sui pendii); a *Fraxinus excelsior*; di degradazione a *Robinia pseudoacacia*.

Variante a *Castanea sativa*.

Varianti intermedie fra i boschi mesofili di farnia, tigli e aceri e i boschi della serie acidofila delle querce roverei.

PIANO SUBMONTANO

SERIE SUBMEDITERRANEA ORIENTALE DELLA ROVERELLA E DELL'ORNIELLO

- Sottoserie piemontese continentale della rovereiella.
- Variante normale a *Quercus pubescens* e *Quercus stremiti* (cedui neutrofilo o poco acidofili mesotermofili).
- Varianti von presenza di *Quercus cerris*; a *Pinus silvestris*; a *Corylus avellana*; variante termofila (più mediterranea) a *Celtis australis*.
- Variante a *Castanea sativa*.
- Xerogramineti

Consorzi rupicoli xerotermici.

Variante mista dei boschi e boscaglie con *Quercus stremiti* e *Quercus sessiliflora* (fitocenosi intermedie fra le due serie).

SERIE ACIDOFILA DELLE QUERCE (ROVERE)

- Variante tipica a *Quercus sessiliflora* (*Quercus petraea*) cedui e fustaie.
- Varianti a *Corylus avellana* ecc.; con frequenza di *Calluna vulgaris* (specialmente nei castagneti) e calluneti in senso stretto.
- Variante a *Castanea sativa* (cedui e fustaie).
- Praterie mesofile
- Coltivi vari, vigneti ecc.
- Consorzi ruderali e rupicoli e di estrema degradazione.
- Fitocenosi boschive intermedie fra i querceti mesofili e i boschi montani (con faggi o altri elementi della faggeta, larici ecc.).

PIANO MONTANO

SERIE ACIDOFILA DEL FAGGIO

- Variante normale a *Fagus sylvatica*.
- Varianti ad *Alnus glutinosa*; a *Betula pendula*; ad *Acer pseudo-platanus*; a *Larix*; variante con frequenza di *Calluna vulgaris* e *Castanea*.
- Praterie

RIMBOSCHIMENTI

- A *Pinus nigra*, *Pinus strobus* e altre essenze forestali.

SIMBOLI

- Larix decidua*
- Quercus cerris*
- Betula pendula*
- Pinus silvestris*
- Carpinus betulus*
- Celtis australis*

0 1 2 3 km

Carte dessinée par J.P. GUICHARD .GRENOBLE 1975

UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE
Laboratoire de Biologie Végétale
"DOCUMENTS DE CARTOGRAPHIE ECOLOGIQUE" tome XVI-1976